

## ವೀಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಾಡು ರೋಡ್ / ಲೊರಗು ರೋಡ್ ಲಿವಂಡಣೆ

ಶುಭ ಸವಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಉಟ್ಟದ ನಂತರವೂ, ನಿತ್ಯ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ, ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಳ್ಳೆದೆಲೆಯು ಸುಳ್ಳಿದಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಬ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡುರೋಗ/ಸೊರಗುರೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೋಗವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೊರಗು ರೋಗದ ನಿವಾಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

### ರೋಗಾಣು :

ವೀಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಾಡುರೋಗ/ ಸೊರಗು ರೋಗವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೇ, ಸ್ಕ್ರೋರೋಶಿಯಂ ರಾಲ್ಫಿಸ್, ರೈಜೋಕ್ಸ್‌ನಿಯಾ ಬಟಾಟಿಕೊಲಾ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲೆಡೋಗ್‌ನ್ ಇನ್‌ಕಾಗ್ನಿಟ್‌ಎ

### ರೋಗದ ಚಿಕ್ಕೆಗಳು:

ಈ ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದರೆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿದಂತಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಜೋತುಬಿಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಹಳ್ಳಿದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಣಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ದಾರದಾಕಾರದ ಸ್ಕ್ರೋರೋಶಿಯಂ ಶಿಲೀಂದ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಜೋತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಹ ಸ್ಕ್ರೋರೋಶಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರೈಜೋಕ್ಸ್‌ನಿಯಾ ಶಿಲೀಂದ್ರದ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ಮೇಲ್ಪುದರು ಹರಿದು ಥಿದ್ದಿದ್ದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಲೆಡೋಗ್‌ನ್ (ಜಂತುಹುಳು) ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ

ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಂತುಹುಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯು ಜೋತೆ ಜೋತೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಡು ರೋಗದಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣಗಿ ಸಾಂಪುಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

### ರೋಗದ ನಿವಾಹಣೆ :

- ❖ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ೨೦೦ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಹಾಕಬೇಕು.
- ❖ ಬಾಡುರೋಗ ಇದ್ದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋತೆದಿಂದ ಪ್ರತಿ ೪ ವರ್ಷಕ್ಕೂಮ್ಯೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗೈ ಮಾಡಬೇಕು.
- ❖ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗಾಣುಗಳು ಇತರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು.
- ❖ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಹಾಗೂ ಬಣಗಿದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇವರ್ಚಿಸಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.
- ❖ ಬಳ್ಳಿ ಇಳಿಸುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇಂ ೨೦೦ ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡಮಾರ್ ಬೆರೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ೨೦೦ಗ್ರಾಂ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರೈಕೋಡಮಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿ ಬಳ್ಳಿಯು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕಗಳಾದ ಕಾಬಿಂಡೆಜಿಮ್ ಇ ಗ್ರಾಂ. ಅಥವಾ ಕಾಬಾಕ್‌ಎನ್ ಇ ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ ನೀರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ❖ ಜಂತು ಹಳುಳುವಿನ ನಿಂಬುಂತ್ರುಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಕಾಬೋಫ್‌ಫ್ಯಾರಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಇಂ ೨೦೦ ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೆ. ಬಿ.ಯಡವಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಹನುಮಂತಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೆಕಟೇಶ ಹೋಸಪನಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರ, ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ-ಬಿಲ್ಡ್ ಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್: ಎಲ್ಲಾರ್ಲೆ ೨೬೩೦೨