

ಇಂದಿನ ಕರು, ನಾಜನ ಕಾಮಧೇನು !

ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಜು ಜಿ. ತೆಗ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಢ ಉಬಾಲೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಲಬಗಾರ್-ಖಿರ್ಜ ೧೦೧

(ಮಿಂಚಂಚಿ: manjunathpatil.2010@rediffmail.com)

“ಅದೇ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರು ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಂತುಹಂತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಕ್ಕೆ ನಂಭವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ೩೫.೪೦ ರಿಂದ ೫೦ರಷ್ಟು ಕರುಗಳು ಜಂತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾಧೆಯಿಂದ ನಾಯುತ್ತವೆ ಏಂಬ ಅಂಶ ನಿಜಕ್ಕೆ ಇತರಂತರಕಾರಿ. ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ದಂಡೆಯೊಳಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಷ್ಟಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕರುವಿನೆ ರೀಣಿಗೆ ನಿರೀಣಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದು.....”

ಹೈನ್ಮಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಭರ್‌ಧರಿಸಿದ, ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವ್ಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕರುಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಸಧ್ಯದ ಕರುವೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೈನ್ಮಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ.

ತಾಯಿಯ ಗಭರ್‌ದಲ್ಲಿನ ಕರುವಿನ ಪಾಲನೆ

ರ್ಯಾಶಾಪಿ ಜನರು ಕರುವಿನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಗಭರ್‌ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಾಯಿ ಗಭರ್‌ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ನಂತರ ಕರುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರಗೆ ತೀವ್ರಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ತಾಯಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ವರ್ಷಾವಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾಯಿಯು ಇನ್ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಗಭರ್‌ವಸ್ತೇಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಂತು ನಾಶಕ ಜೀವಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದೇ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರು ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಂತುಹಂತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ೩೯.೯೦ ರಿಂದ ೫೦ರಷ್ಟು ಕರುಗಳು ಜಂತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾಧೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರಂತರಕಾರಿ.

ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವಿನ ಪಾಲನೆ

ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಾಯಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವಿನ ಕಾಲುಗಳ ಕೊಳಗಿನ ಮುಂತುದಿಯನ್ನು ಅಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಕರುಗಳನ್ನು ಶ್ವಸಕೋಶದ ರೋಗ (ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ) ಬರದಂತೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಡಬೇಕು. ಹೊಕ್ಕಳ ಮರಿಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಗೀಗಿ ೧೦ ರಿಂದ ೨೦ ಅಂಗುಲ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನಂಜನಾಶಕ ಜೀವಧಿಗಳಾದ ಟಿಂಕ್ಟ್‌ ಆಯೋಡಿನ್ ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೆವಲಾನ್ ದ್ವಾರಾವಣನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಸೆಗಳೆ, ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಗಾಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಕ್ಕಳ ಕುರು ಮತ್ತು ಕೀಲುಹುಣ್ಣಿ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.



ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ಅರ್ಥ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ೩೯.೯೦ ರಷ್ಟು ಗ್ರಾವರ್‌ ಗ್ಲೈಬ್ಯಾಲ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ವಾತ್ತು ಅರ್ಥಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪಚನವಾಗದೇ ಅನ್ನನಾಳದ ಮುಖಿಂತರ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಲಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಸಾರಜನಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲು ಸೌವ್ಯ ಜುಲಾಬಿನ್ ಒಂತಿರುವುದರಿಂದ

ಅನ್ನಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಮಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲನ್ನು ಮೊದಲ
ಬದುದಿನ ಯಂತ್ರೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕುಡಿಸಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ದೇಹದ ತೂಕದ ರ್ಮನೇ ರ್ಮೀ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು.
ಉದಾ: ಒಂದು ಕರುವು ರ್ಮೀ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದರೆ
ರ್ಮಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ರ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲನ್ನು
ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಿ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಳ್ಳಿಲನ್ನು ತೊಳೆದು
ನಂತರವೇ ಕರುವನ್ನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.

జంతు నాశక బైషది

ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ಉನೇ ದಿನ, ರಜಿನೇ ದಿನ, ರನೇ ತಿಂಗಳು, ಲಿನೇ ತಿಂಗಳು, ಇನೇ ತಿಂಗಳು, ಉನೇ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಂತು ನಾಶಕ ಜಿಡ್ ಧಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಣಾದಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃಹತ್ತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಸಾಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಕರುಗಳಂತೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋರಿ ಅಥವಾ ಕೋಣ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಬಹುದು.

ಕರುವಿನ ಕೋಡನ್ನು, ತೆಗೆಯುವುದು

జానువారుగణిగె కోచు తన్న ఆత్మ సంరక్షణగాగి ఇరుత్తదె. ఆదరె, సాకిద మిత్రతలి ఆశభూగణిగె (ముఖ్యివాగి హబ్బె.ఎఫ్. హాగూ జస్టిస్) కొంచిన

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕರು ಹಂಟಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕೊಂಬಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೋಡು ಸುಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕೋಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ, ಕೋಡು ಮುರಿತ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ದನಗಳು ಕೋಡಿನಿಂದ ಕಾದಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೋಡಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ତାଣୀ ଜ୍ଲେଦ କରୁଗଲେ

ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದುರದ್ವಷ್ಟದಿಂದ ತಾಯಿಯು ಹೆರಿಗೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬೇದಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಯಿಂದ ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸತ್ತು ಹೊಡರೆ ಶೈಲಿ ಮಿ.ಲಿ. ಹಾಲು, ೧೧೦ಮಿ.ಲಿ. ನೀರು, ಉ

ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆ, ರ/ಅ ಟೀ ಚಮಚ
ಅರಳಿಣ್ಣೆ (ಸ್ಯಾಡಲ ಎಣ್ಣೆ), ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿಟಕಾಮಿನ್‌ ‘ವ’
ಯಂತನ್ನು ಬೇರೆಸಬೇಕು. ಈ
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕರುಹಿನ ದೇಹದ
ತೊಕದ ರನೇ ರ೦ ಭಾಗದಷ್ಟನ್ನು
ದಿನದಲ್ಲಿ ೩ ಬಾರಿ ಸುಡಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟೂ ರೋಂಗು ಗಿ,
ತಾಯಿಂಗು ಲೆ ತಿಂಗಳು
ಂಗ ಜಂತುನಾಶಕ ಜೈವಧಿ, ಹುಟ್ಟಿದ
ಗಿಣ್ಣಿದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂ
ಕೇ ಜಂತುನಾಶಕ ಜೈವಧಿಯನ್ನು
ದ ಕರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರು ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಕರು ಎಂಬ
ಜೊಂಪಾನ ವರಾಡುವುದು
ಯಖವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದು ಆದ್ಯ

