

ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನೆಂಬರ್ ಅಂಗಡಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯ

ಹಿಂಗಾರಿ ಜೋಳ : ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಡಕೊರೆಯು ಹುಳದ ಬಾಧೆಯಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೩ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಶೇ. ೨ ರ ಕಾರ್బೋಎಂಬಾರಾನ್ ಹರಳನ್ನು ಸಸಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾರೆ ನೀರು ಹೊಡಬೇಕು.

ಗೋಧಿ : ನೀರಾವರಿ ಗೋದಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಲೀಟರ್ ರಿಂದ ಲೀಟರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕುಟ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಶಿಫಾರಿತ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಗೋಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿ. ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಗೋಬ್ಬರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ತುಕ್ಕ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಿ. ಮಿ. ಲೀ. ಮೋಟಿಕೋನಜೋಲ್ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರು ತುಟಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಹಿಂಗಾರಿ) : ಶಿಫಾರಿತ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಗೋಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಇಂದಿನ ಗೋಮೈ ಮೇಲು ಗೋಬ್ಬರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೀರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಇಂದಿನ ಗೋಮೈ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಕಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಬಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಸರದಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು.

ಕಡಲೆ : ಗೋವಿನಜೋಳ ಕಟಪಾವು ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು (ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲವಾರ) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಜಿವುಟಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨ ರ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂವಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತೆಳವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ತುಟಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೂ ವಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ೨೦ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಹುಳಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಕೇಬಿ ಭಕ್ಕಕ ಪ್ರಕ್ಕಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ವರಚುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲು ಕೆವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೆಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಕೇಡೆ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.

ಹುಮಕಿ : ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೀರಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಡ ಹೊಡೆದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೇನು ಬಾಧೆ ಹತೋಟಿಗೆ O.೨ ಗ್ರಾಂ ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಮ್ ಲಿಟರ್ ಡಬ್ಲೂ.ಜಿ. ಅಥವಾ ೧ ಗ್ರಾಂ ಅಸಿಫೇಟ ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೨೦ ದಿನಕೊಮೈ ಲಿ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಂಕರ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ : ೨೦-೩೦ ದಿನದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಸಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಫಾರಿತ ಸಾರಜನಕ ಗೋಬ್ಬರವನ್ನು ಮೇಲು ಗೋಬ್ಬರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೀರಿಸಿ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ ಲಿ. ಮಿ.ಲೀ. ಕ್ಲಿನಾಲ್‌ಫಾಸ್ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

